

PAS IMDHÍONTA



www.immunisation.ie

Ainm

Is doiciméad tábhachtach é seo agus ba cheart é a choimeád in áit shábháilte.

Dáta
breithe

www.immunisation.ie

Do leanaí a rugadh an
1 Deireadh Fómhair
2016 nó ina
dhiadh sin



Réamheolas

Is é aidhm an Phas Imdhíonta seo ná a chinntiú go bhfuil taifead agat ar d'imdhíonadh go léir.

Ba cheart iad seo a leanas ar fad a chuimsiú sa taifead seo:

- **príomh-imdhíontaí mar leanbh,**
- **imdhíontaí ar scoil,**
- **taisteal, agus**
- **imdhíontaí mar dhuine fásta**

D'fhéadfaí go mbeadh vacsaíní eile ag teastáil uait ó am go chéile tar éis ráige galair nó le haghaidh oibre nó taistil. Is féidir na vacsaíní sin a chlárú sa leabhrán seo freisin.

Tabhair an Pas Imdhíonta seo leat gach uair a fhreastalaíonn tú ar choinne imdhíonta, le do thoil.

Ainm

Aitheanta chomh maith mar

Dáta Breithe

Ionad Breithe

Seoladh

Uimhir Theagmhála

Fón Póca

Seoladh Ríomhphoist

Aitheantóir Uathúil Sláinte

Uimh. PSP

Ailléirgí

I gCás Éigeandála

Ainm(neacha)

Uimhir Theagmhála

Ainm an Dochtúra

Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Dochtúra

Ainm an Dochtúra

Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Dochtúra

Ainm an Dochtúra

Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Dochtúra

Coinnigh an leabhrán seo in áit shábháilte agus tabhair leat é chuig gach coinne vacsaínithe.

Léiríonn an tábla thíos cén aois ag a ndéantar imdhíonadh ar leanaí, cá háit a ndéantar é agus cé na vacsaíní a bhíonn i gceist.

Cén uair

Cá háit

Vacsainí

2
mhí

Lialann
Cuairt 1

6 in 1+PCV+MenB+Rótavíreas
3 Instealladh + Braonta Béil

4
mhí

Lialann
Cuairt 2

6 in 1+MenB+Rótavíreas
2 Instealladh + Braonta Béil

6
mhí

Lialann
Cuairt 3

6 in 1+PCV+MenC
3 Instealladh

Ní thugtar vacsaín rótaivíris ag 8 mí 0 lá nó ina dhiaidh sin

12
mhí

Lialann
Cuairt 4

MMR+MenB
2 Instealladh

13
mhí

Lialann
Cuairt 5

Hib/MenC+PCV
2 Instealladh



Naíonáin bheaga (an chéad bhliain sa bhunscoil)	Scoil*	4 vacsaín in 1 cheann amháin + MMR
An chéad bhliain den mheánscoil (caillíní amháin)	Scoil	HPV (2 doses)
An chéad bhliain den mheánscoil	Scoil	Tdap
An chéad bhliain den mheánscoil	Scoil	MenC
Gach bliain (idir Deireadh Fómhair agus Aibreán)	Dochtúir teaghlach nó poitigeir	F u**

* Níl na vacsaíní seo le fáil ach ón dochtúir teaghlach i Sligeach, i Liatroim agus i nDún na nGall.

** Dóibh siúd atá 65 bliana d'aois nó níos sine agus i ngrúpaí atá i mbaol.

6 vacsaín in 1 cheann amháin

Diftéire, Haemophilus influenzae b (Hib), Heipitéas B, Triuch, Póilíó agus Teiteanas

PCV

Vacsainí níumacocúil chomhchuingeach

MenB

Ionfhabhtú Meiningeacocúil B

MenC

Ionfhabhtú Meiningeacocúil C

Rótavíreas

Vacsainí bhéil rótaivíris

BLBD

Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg

Hib/MenC

Vacsainí chomhcheangailte Haemophilus influenzae b + Ionfhabhtú Meiningeacocúil C

Príomh-imdhíonadh Óige

Do leanaí a rugadh an 1 Deireadh Fómhair
2016 nó ina dhiaidh

Ainm

Dáta breithe

Ainm na vacsaíne	Aois a thugtar é	Déantóir	Cnuasuimhir	Dáta Éaga	Bealach/Suíomh	Tugtha ag	Dáta
------------------	------------------	----------	-------------	-----------	----------------	-----------	------

Cuairt 1 ar an Dochtúir Teaghlach 2 mhí

6 in 1							
PCV							
MenB							
Róta							

Cuairt 2 ar an Dochtúir 4 mhí

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

6 in 1							
MenB							
Róta							

Cuairt 3 ar an Dochtúir 6 mhí

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

6 in 1							
PCV							
MenC							

6 vacsaín in 1 cheann amháin

MenC

Diftéire, Haemophilus influenzae b (Hib), Heipitéas B,
Triuch, Póilió, Teiteanas
Ionfhabhtú Meiningeacocúil C

PCV
MenB
Róta

Vacsaín níumacocúil chomhchuingeach
Ionfhabhtú Meiningeacocúil B
Rótavíreas

Imdhíonadh Scoile

Ainm

Dáta breithe

Ainm na vacsaíne	Aois a thugtar é	Déantóir	Cnuasuimhir	Dáta Éaga	Bealach/Suíomh	Tugtha ag	Dáta
4 vacsaín in 1 cheann amháin							
BLBD							
Tdap							
MenC							
HPV, dáileog 1							

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

HPV, dáileog 2							
Eile							

4 vacsaín in 1 cheann amháin
BLBD
Tdap

Díféire, Triuch, Póilíó, Teiteanas
Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg
Teiteanas, dáileog íseal diféire agus triuch éigeallach

MenC
HPV

Ionfhabhtú Meiningeacocúil C
Papalómaivíreas daonna

Comhairle iar-vacsáinithe

Céard iad na frithghníomhartha coitianta a d'fhéadfadh teacht ar mo leanbh tar éis dó/dí a bheith vacsaínithe agus céard ba chóir dom a dhéanamh?

Frithghníomh coitianta	Cad ba chóir a dhéanamh
Bíonn sé coitianta fiabhras a fháil tar éis vacsaín MenB ag aois 2 agus 4 mhí (cuairt 1 agus 2)	Tabhair paraicéiteamól leachtach naíonáin <ol style="list-style-type: none">1. Tabhair 2.5 ml (60 mg) tráth a thugtar an vacsaín nó go gairid ina dhiaidh sin.2. Tabhair an dara dáileog de 2.5 ml (60 mg) idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis na chéad dáileoige.3. Tabhair an tríú dáileog de 2.5 ml (60 mg) idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis an dara dáileoige.4. Tabhair an ceathrú dáileog idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis an tríú dáileog má bhíonn fiabhras ar an leanbh i gcónaí.
Tinneas, at* agus deargadh in áit an insteallta	Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun tinnis agus pianta a fhuascailt. Déan deimhin de nach bhfuil éadaí ró-chúng nó ag cuimilt i gcoinne áit an insteallta.
Buinneach éadrom tar éis na vacsaíne rótaiviris	Tabhair breis bainne le hól. Nigh do lámha go cúramach tar éis clúidín do linbh a athnú agus a chur sa bhosca bruscair.
Fiabhras (os cionn 39 °C)	Ná cuir an iomarca éadaí ar an leanbán. Bí cinnte de nach bhfuil a s(h)eomra ró-the. Tabhair sreabháin breise le n-ól. Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun an fiabhrais a íslú.
Tinneas cinn nó greannaitheacht	Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun tinnis agus pianta a fhuascailt.

I gcás páistí scoile, d'fhéadfaí go mbeadh an sciathán ata ón nualainn go dtí an uillinn. Is gnách go dtarlaíonn sé seo taobh istigh de dhá lá tar éis na vacsaíne agus éiríonn sé níos fearr tar éis 4-5 lá. Níl gá le hantaibheathaigh chun an frithghníomhú logánta seo a chóireáil

- Tá an dáileog de pharaicéiteamól nó iobúpróifein a mholtar do do leanbh scríofa ar an mbuidéal agus braitheann sé ar aois an linbh.
- Iarr ar do phoitigéir meascán paraicéiteamóil nó iobúpróifeine gan siúcra atá oiriúnach d'aois do linbh a thabhairt duit.
- Is féidir le húsáid paraicéiteamóil nó iobúpróifeine thar tréimhse fhada gan chomhairle ó dhochtúir dochar a dhéanamh.

Má tugadh vacsaín MMR do do leanbh, b'fhéidir go dtiocfadh gríos air/uirthi 6-10 lá ina dhiaidh sin (bruitíneach bheag). Níl sé seo tógalach.

Nótaí

Arna fhoilsiú ag: Oifig Náisiúnta Imdhíonta FSS
Dáta foilsithe: Deireadh Fómhair 2016
Cód ordaithe: HNI00936