


Proteja a sus hijos con la vacuna BCG

¿Qué es la TB (tuberculosis)?



La TB es una infección que se propaga a través del aire y afecta principalmente a los pulmones. Se puede tratar, pero el tratamiento puede llevar mucho tiempo.

La TB afecta principalmente a los pulmones, pero puede afectar a otras partes del cuerpo. Los niños pequeños son más propensos a desarrollar TB en otras partes del cuerpo, como el cerebro (meningitis tuberculosa). La TB suele ser tratable con los medicamentos adecuados, pero el tratamiento es largo.

¿Quién necesita la vacuna BCG?

La vacuna BCG ofrece protección frente a la TB. En Irlanda, la mayoría de los niños no necesitan la vacuna BCG, ya que la TB actualmente es poco frecuente.

Ofrecemos la vacuna BCG a niños menores de 12 meses que presentan un mayor riesgo de entrar en contacto con la TB. Son los menores de 12 meses que:

- viven con alguien nacido en un país con altas tasas de TB.
- han nacido o vivido durante más de tres meses en un país con altas tasas de TB y todavía no han recibido la vacuna BCG.
- nacieron de padres con TB no tratada o están en contacto habitual con personas que padecen esta enfermedad.

Puede consultar todos los países con altas tasas de TB visitando la página web de la Organización Mundial de la Salud:

- www.who.int/health-topics/tuberculosis

En algunos casos, es posible que se recomiende la vacuna BCG a otros niños; su profesional sanitario le informará al respecto.



¿Qué personas no deben recibir la vacuna BCG?

Algunos niños no deben recibir la vacuna BCG. El/la enfermero/a o médico/a hablarán con usted antes de la vacunación para asegurarse de que su bebé puede recibir la vacuna BCG.

Si su hijo/a se encuentra mal, retrase la vacunación.

Si su hijo/a se encuentra mal y tiene fiebre (más de 38 grados Celsius), debe posponer la vacuna BCG hasta que se encuentre bien.

Si no está seguro/a de si su hijo/a debería vacunarse, consulte a su médico/a o enfermero/a: **¿Mi bebé necesita la vacuna BCG?»**


Para obtener más información, visite hse.ie/bcg

Plain English
Approved by NALA



Antes de la vacunación

Prueba del talón para bebés



A los padres de todos los bebés nacidos en Irlanda se les ofrece la posibilidad de realizar la prueba de punción en el talón a sus bebés en el plazo de una semana tras el nacimiento.

A los progenitores de bebés que se trasladan a Irlanda cuando estos tienen menos de 12 meses de edad también se les ofrece esta posibilidad.

Esta prueba permite detectar algunas enfermedades graves, entre ellas algunas que afectan al sistema inmunitario. Tenemos que comprobar los resultados de esta prueba antes de poder administrarle a su bebé la vacuna BCG.

Compruebe si su hijo/a podría haber estado expuesto/a a la TB

Su bebé debe someterse a una prueba antes de recibir la vacuna BCG si:

- ha nacido en un país con altas tasas de TB.
- ha vivido en un país con altas tasas de TB durante más de 3 meses.
- es contacto de un caso de TB no tratado.

Esta prueba comprueba si ya se ha infectado de TB.



¿Tengo que retrasar la administración de las demás vacunas infantiles si a mi hijo/a le ponen la vacuna BCG?

No. Podemos administrar las vacunas infantiles en cualquier momento después de la vacuna BCG. No debe retrasar su solicitud para su hijo/a.

Si un niño mayor necesita otra vacuna en los tres meses posteriores a la administración de la vacuna BCG, debe ponérsela en el otro brazo.



Avisar de efectos secundarios

Si cree que la vacuna le ha producido efectos secundarios, puede avisar a la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Irlanda (Health Products Regulatory Authority, HPRA) en www.hpra.ie. Su médico, enfermera, farmacéutico o un familiar también pueden notificar el efecto secundario a la HPRA.

También encontrará enlaces a los prospectos sobre la vacuna en www.hpra.ie. Busque «BCG vaccine» (vacuna BCG) para consultar la información pertinente.

Junio de 2026.