


Protégez votre enfant avec le vaccin BCG

Qu'est-ce que la TB (tuberculose) ?



La TB est une infection qui se propage par voie aérienne et affecte principalement les poumons. C'est une maladie curable, mais le traitement peut être long.

Bien que la TB touche principalement les poumons, d'autres parties du corps peuvent être atteintes. Les jeunes enfants ont plus de risques de contracter la TB dans d'autres organes, par exemple dans le cerveau (méningite tuberculeuse). La TB se soigne avec les médicaments appropriés, mais le traitement est long.

À qui est destiné le vaccin BCG ?

Le vaccin BCG protège contre la TB. En Irlande, la plupart des enfants n'ont pas besoin de ce vaccin car la TB n'est pas une maladie répandue.

Nous proposons le BCG aux enfants de moins de 12 mois qui sont à plus à risque d'entrer en contact avec la TB. Il s'agit des enfants de moins de 12 mois qui:

- vivent avec une personne née dans un pays qui présente un taux élevé de TB.
- sont nés ou ont vécu plus de trois mois dans un pays où le taux de TB est élevé et n'ont pas encore reçu le vaccin BCG.
- sont nés de parents ou sont en contact avec des personnes qui ont une TB non traitée.

Vous trouverez l'ensemble des pays dont le taux de TB est élevé sur le site de l'Organisation mondiale de la santé:

- www.who.int/health-topics/tuberculosis

De temps à autre, d'autres enfants peuvent se voir recommander le vaccin BCG. Demandez conseil à votre professionnel de santé.



Qui ne doit pas recevoir le vaccin BCG ?

Certains enfants ne doivent pas recevoir le vaccin BCG.

L'infirmière ou le médecin aura un entretien avec vous avant la vaccination pour s'assurer que votre bébé est éligible au vaccin BCG.

Si votre enfant ne va pas bien, repoussez la vaccination.


Si votre enfant ne va pas bien et a une température élevée (supérieure à 38 degrés Celsius), vous devez reporter le vaccin BCG jusqu'à son rétablissement.

Si vous ne savez pas si votre bébé doit être vacciné, demandez conseil à votre médecin ou votre infirmière: « **Mon bébé a-t-il besoin du vaccin BCG ?** »

Pour plus d'informations, consultez hse.ie/bcg

Avant la vaccination

Test du buvard pour les nouveau-nés



Un test du buvard est proposé aux parents de l'ensemble des nouveau-nés au cours de la semaine qui suit la naissance.

Les parents qui ont déménagé en Irlande lorsque leur enfant avait moins de 12 mois se voient également proposer un test du buvard pour leur bébé.

Ce test dépiste certaines maladies graves, notamment des maladies qui touchent le système immunitaire. Nous devons consulter les résultats de ce test avant de pouvoir vacciner votre bébé avec le BCG.

Vérifiez si votre bébé ou votre enfant peut avoir été exposé à la TB

Votre bébé doit être dépisté avant de recevoir le vaccin BCG si:

- il est né dans un pays avec un taux élevé de TB.
- il a vécu dans un pays avec un taux élevé de TB pendant plus de 3 mois.
- il est en contact avec un cas de TB non soignée.

Ce test dépiste s'il a déjà été infecté par la TB.



Dois-je repousser d'autres vaccins infantiles si mon enfant reçoit le BCG ?

Non, vous pouvez lui faire administrer les vaccins infantiles à tout moment après le vaccin BCG. Vous ne devez pas repousser les autres vaccins de votre enfant.

Si un enfant plus âgé a besoin d'un autre vaccin dans les 3 mois suivant le BCG, il doit recevoir le vaccin dans l'autre bras.



Signaler des effets secondaires

Si vous pensez que votre enfant présente un effet secondaire après avoir reçu un vaccin, vous pouvez le signaler à la Health Products Regulatory Authority (HPRA – Autorité de régulation des produits de santé) sur www.hpra.ie. Votre médecin, votre infirmière, votre pharmacien ou un membre de votre famille peut également signaler l'effet secondaire à la HPRA.

Vous pouvez également trouver les liens vers les notices du vaccin sur le site www.hpra.ie. Cherchez l'expression vaccin BCG pour lire les informations pertinentes.

Juin 2026.