


Proteja seu filho com a vacina BCG

O que é a tuberculose?



A tuberculose é uma infecção transmitida pelo ar que afeta principalmente os pulmões. Existe tratamento, mas ele pode levar bastante tempo.

A tuberculose afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outras partes do corpo. Crianças pequenas têm maior probabilidade de contrair tuberculose em outras partes do corpo, como por exemplo o cérebro (meningite tuberculosa). A tuberculose geralmente pode ser tratada com os medicamentos certos, mas o tratamento é demorado.

Quem precisa da vacina BCG?

A vacina BCG protege contra a tuberculose. Na Irlanda, a maioria das crianças não precisa da vacina BCG, porque a tuberculose hoje é pouco comum.



Oferecemos a vacina BCG a crianças menores de 12 meses de idade que apresentam maior risco de entrar em contato com a tuberculose. Essas crianças são aquelas com menos de 12 meses de idade e que:

- Moram com alguém que nasceu em um país com alto índice de tuberculose.
- Nasceram ou viveram por mais de três meses em um país com alto índice de tuberculose e ainda não tomaram a vacina BCG.
- Nasceram de pais com tuberculose não tratada ou têm contato regular com pessoas nesta condição.

Você pode encontrar todos os países com alto índice de tuberculose acessando o site da Organização Mundial da Saúde:

- www.who.int/health-topics/tuberculosis

Ocasionalmente, pode ser recomendado que outras crianças tomem a vacina BCG — seu médico irá orientá-lo a esse respeito.

Quem não deve tomar a vacina BCG?

Algumas crianças não devem tomar a vacina BCG. A enfermeira ou o médico irá conversar com você antes da vacinação para ter certeza de que seu bebê está apto a tomar a vacina BCG.

Se seu filho não estiver se sentindo bem, deixe a vacina para outro dia.

Se seu filho não estiver bem e com febre (acima de 38 graus Celsius), você deve adiar a vacina BCG até que a criança esteja saudável.

Se você não tiver certeza se seu bebê deve tomar a vacina, consulte seu médico ou enfermeira: **“Meu bebê precisa tomar a vacina BCG?”**


Para mais informações, visite hse.ie/bcg

Plain English
Approved by NALA



Antes da vacinação

Teste do pezinho para bebês



Todos os pais de bebês nascidos na Irlanda têm a oportunidade de fazer o teste do pezinho nos seus bebês dentro de uma semana após o nascimento.

Os pais de bebês que estão se mudando para a Irlanda e cujos bebês são menores de 12 meses de idade também têm a possibilidade de realizar o teste do pezinho em seus bebês.

Este exame verifica a presença de algumas doenças graves, incluindo aquelas que afetam o sistema imunológico. Precisamos analisar os resultados desse exame antes de podermos aplicar a vacina BCG no seu bebê.

Realize um exame para saber se seu bebê ou criança mais velha pode ter sido exposto à tuberculose

Seu bebê deve fazer um exame antes de receber a vacina BCG se ele:

- Nasceu em um país com alto índice de tuberculose.
- Morou em um país com alto índice de tuberculose por mais de 3 meses.
- Esteve em contato com um caso de tuberculose não tratada.

Esse exame verifica se ele já foi infectado com tuberculose.



Preciso adiar as outras vacinas infantis se meu filho tomar a BCG?

Não. Podemos administrar as vacinas infantis a qualquer momento após a vacina BCG. Você não deve adiar a aplicação dessas vacinas para seu filho.

Se uma criança mais velha precisar tomar outra vacina dentro de 3 meses após ter tomado a BCG, ela deve receber a vacina no outro braço.



Comunicação de efeitos colaterais

Se você acha que você ou seu filho tiveram um efeito colateral após receber uma vacina, você pode comunicar o caso à Health Products Regulatory Authority (HPRA) em www.hpra.ie. Seu médico, enfermeira, farmacêutico ou um membro da família também pode comunicar o efeito colateral à HPRA.

Você também pode encontrar links para os folhetos de informações ao paciente sobre a vacina em www.hpra.ie. Pesquise “vacina BCG” para ler as informações relevantes.

Junho de 2026.