


# Protejați-vă copilul administrându-i vaccinul BCG

## Ce este TBC-ul (tuberculoza)?



TBC-ul este o infecție care se transmite pe cale aeriană și afectează mai ales plămâni. Această infecție este tratabilă, însă tratamentul poate fi de lungă durată.

TBC-ul afectează în special plămâni, însă poate afecta și alte organe. În cazul copiilor mici, există o predispoziție de transmitere a TBC-ului și la alte organe, de exemplu, la creier (meningită tuberculoasă). TBC-ul este, de obicei, tratat, cu medicamentele corecte, însă tratamentul este de lungă durată.

## Cine are nevoie de vaccinul BCG?

Vaccinul BCG oferă protecție împotriva TBC-ului. În Irlanda, majoritatea copiilor nu au nevoie de vaccinul BCG, deoarece incidența TBC-ului este mică în prezent.

Noi oferim vaccinul BCG pentru copiii cu vârste de sub 12 luni, care sunt expuși unui risc mare de a se îmbolnăvi de TBC. Acești copii sunt cei cu vârste de sub 12 luni, care:

- locuiesc cu o persoană născută într-o țară cu rate mari de incidență a TBC-ului.
- au fost născuți sau au trăit timp de peste trei luni într-o țară cu rate mari de incidență a TBC-ului și nu au primit deja vaccinul BCG.
- au părinți care suferă de un TBC netratat sau intră cu regularitate în contact cu persoane care suferă de un TBC netratat.

Lista tuturor țărilor cu rate mari de incidență a TBC-ului poate fi consultată pe site-ul web World Health Organization:

- [www.who.int/health-topics/tuberculosis](http://www.who.int/health-topics/tuberculosis)

Ocazional, și altor copii le-ar putea fi recomandată administrarea vaccinului BCG – sfaturi în această privință vă vor fi oferite de furnizorul dumneavoastră de servicii medicale.



## Cui nu ar trebui să i se administreze vaccinul BCG?

Anumiți copii nu ar trebui să primească vaccinul BCG. Înainte de vaccinare, asistentul medical sau medicul va discuta cu dumneavoastră, pentru a se asigura că bebelușul dumneavoastră este eligibil pentru administrarea vaccinului BCG.

## În cazul în care copilul dumneavoastră nu se simte bine, amânați administrarea vaccinului.


În cazul în care copilul dumneavoastră nu se simte bine și are temperatură mare (peste 38 de grade Celsius), trebuie să amânați administrarea vaccinului BCG până când copilul dumneavoastră se va simți bine.

În cazul în care nu știți sigur dacă bebelușul dumneavoastră ar trebui să primească vaccinul, întrebați medicul sau asistentul medical: „**Are bebelușul meu nevoie de vaccinul BCG?**”

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web [hse.ie/bcg](http://hse.ie/bcg)

## Înainte de vaccinare

### Testul înțepătură în călcâi pentru bebeluși



Părinții tuturor bebelușilor născuți în Irlanda pot beneficia de testul înțepătură în călcâi pentru bebelușii lor în prima săptămână de la naștere.

Părinții care se mută în Irlanda cu bebelușii lor cu vârste de sub 12 luni pot, de asemenea, să beneficieze de testul înțepătură în călcâi pentru bebelușii lor.


Prin acest test se verifică prezența anumitor afecțiuni medicale grave, inclusiv prezența afecțiunilor care afectează sistemul imunitar. Apoi noi trebuie să verificăm rezultatele acestui test, pentru a stabili dacă bebelușului i se poate administra vaccinul BCG.

### Verificați dacă este posibil ca bebelușul sau copilul dumneavoastră să fi fost expus la TBC

Înainte de administrarea vaccinului BCG, bebelușului dumneavoastră ar trebui să i se facă un test, în cazul în care bebelușul:

- a fost născut într-o țară cu rate mari de incidență a TBC-ului.
- a locuit timp de peste 3 luni într-o țară cu rate mari de incidență a TBC-ului.
- intră deja în contact cu o persoană care suferă de un TBC netratat.

Prin acest test se verifică dacă bebelușul dumneavoastră a fost deja infectat cu TBC.



## În cazul în care copilul meu primește vaccinul BCG, este necesar să-i amân administrarea celorlalte vaccinuri ale copilăriei?

Nu. Celelalte vaccinuri ale copilăriei pot fi administrate în orice moment după vaccinul BCG. Nu este necesar să amânați administrarea acestora pentru copilul dumneavoastră.

În cazul în care unui copil de vârstă mai mare trebuie să i se administreze un alt vaccin în decurs de 3 luni de la administrarea vaccinului BCG, vaccinul trebuie făcut în celălalt braț.



## Raportarea efectelor secundare

În cazul în care dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți un efect secundar după administrarea unui vaccin, puteți raporta acest lucru către Autoritatea de reglementare a produselor medicale (HPRA), pe site-ul web [www.hpra.ie](http://www.hpra.ie). De asemenea, medicul dumneavoastră, asistentul medical, farmacistul sau un membru al familiei pot raporta efectul secundar către HPRA.

De asemenea, pe site-ul web [www.hpra.ie](http://www.hpra.ie) puteți găsi legături către broșurile de informare a pacientului privind vaccinul. Pentru a găsi informațiile relevante, căutați vaccinul BCG.

Iunie 2026.