Vaccinul antigripal

pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 17 ani

2026/27



www.hse.ie/flu

Vaccinul antigripal pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 17 ani

În sezonul gripal 2026/2027, tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 17 ani le va fi oferit gratuit vaccinul antigripal sub formă de spray nazal.

Această broșură explică de ce este important ca copiilor să li se administreze vaccinul antigripal. În cadrul acesteia este specificat unde i se poate administra vaccinul antigripal copilului dumneavoastră și vă sunt oferite informații importante despre vaccin.

Vă rugăm să citiți cu atenție.

Ce este gripa?

Gripa este o boală foarte infecțioasă cauzată de virusul gripal. Gripa se răspândește cu ușurință și infectează atât copiii, cât și adulții.

Gripa este răspândită în cadrul comunității în timpul sezonului gripal. Sezonul gripal începe, de obicei, la începutul lunii octombrie și durează până la sfârșitul lunii aprilie.

Cum sunt copiii afectați de gripă?

Copiii sunt mai predispuși decât adulții la dezvoltarea de complicații severe ale gripei.

Copiii bolnavi de gripă lipsesc de la creșă, grădiniță și școală. De asemenea, aceștia își întrerup activitățile obișnuite, cum ar fi pasiunile și sportul.

În ultimii 10 ani în Irlanda:

- Mai mult de **10.000** de copii au fost spitalizați din cauza gripei
- Mai mult de **200** de copii au avut nevoie de terapie intensivă (ATI)
- Din păcate, **22** de copii au decedat

Poate gripa să provoace afecțiuni grave la copii?

Da. Printre complicațiile gripei se numără pneumonia, bronșita și, rareori, inflamația creierului (encefalită).

Copiii cu afecțiuni cronice prezintă cel mai mare risc de complicații grave ale gripei.

Cum îmi va proteja vaccinul antigripal copilul?

Vaccinul antigripal ajută sistemul imunitar al copilului dumneavoastră să producă anticorpi (proteine care combat infecția).

Dacă copilului dumneavoastră i s-a administrat vaccinul antigripal și intră în contact cu virusul gripal, vaccinul îl poate feri de îmbolnăvire.

Dacă copilului meu i se administrează vaccinul antigripal, sunt protejate și alte persoane?

Dacă copilului dumneavoastră i se administrează vaccinul antigripal, se reduce gradul de răspândire a gripei către alte persoane. Acest lucru ajută la protejarea împotriva gripei a persoanelor din acestuia, de exemplu, frații, surorile, părinții și bunicii.

Dacă sunt vaccinați suficient de mulți copii, numărul persoanelor care se vor îmbolnăvi de gripă sau care vor avea nevoie de tratament în spital se va

reduce. Acest lucru este foarte important pentru sănătatea populației și serviciile noastre de sănătate, în special în timpul iernii.

Care este denumirea vaccinului antigripal pentru copii?

Vaccinul antigripal pentru copii se numește Fluenz și este fabricat de AstraZeneca.

Vaccinul antigripal pentru copii este administrat copiilor din Regatul Unit începând din anul 2013 și copiilor din Irlanda începând din anul 2020.

Cum se administrează vaccinul?

Vaccinatorul va administra vaccinul **pulverizându-l în nasul copilului** (vaccin nazal). Acesta va efectua câte o pulverizare în fiecare nară. Nu este necesară administrarea unei injecții, iar procedura nu este dureroasă.

Copilul dumneavoastră poate respira normal în timp ce i se administrează vaccinul. Nu este nevoie să inspire adânc sau să aspire pe nas.

Unii copii care au afecțiuni cronice, precum afecțiuni cardiace sau pulmonare cronice, pot avea nevoie de două doze, administrate la un interval de patru săptămâni.

Există vreo categorie de copii care nu trebuie vaccinați cu vaccinul antigripal nazal?

Unui număr foarte mic de copii nu li se va putea administra vaccinul antigripal nazal, din motive medicale.

Vaccinul **nu** trebuie administrat copiilor sau persoanelor tinere dacă:

- au prezentat o reacție alergică gravă la administrarea unei doze anterioare de vaccin antigripal sau la orice componentă a acestuia
- suferă de astm sever sau au prezentat șuierat astmatic sau au avut nevoie de inhalator mai mult decât de obicei pe parcursul celor trei zile anterioare zilei de vaccinare; în cazul în care copilul dumneavoastră suferă de astm sever (de exemplu, dacă a avut nevoie în mod regulat de steroizi administrați pe cale orală sau dacă a trebuit să se prezinte în secția ATI din cauza astmului), trebuie să discutați despre vaccinul antigripal nazal cu echipa sa de specialiști/medicul pneumolog sau asistentul medical
- li se administrează medicamente numite salicilați, printre care se numără și aspirina
- au un sistem imunitar extrem de slăbit din cauza anumitor afecțiuni sau tratamente medicale
- locuiesc cu o persoană care are un sistem imunitar extrem de slăbit (de

exemplu, o persoană care a fost supusă recent unui transplant de măduvă osoasă)

- au luat în ultimele 48 de ore medicamente antivirale pentru combaterea gripei
- suferă de o afecțiune care cauzează scurgeri de lichid cefalorahidian (CSF) - fluidul din jurul creierului și măduvei spinării
- sunt însărcinate sau alăptează.

Discutați cu medicul înainte de a-i administra copilului vaccinul antigripal nazal, în cazul în care copilul are un implant cohlear, în cazul în care suferă de neutropenie severă (niveluri scăzute ale unui anumit tip de globule albe) sau în cazul în care i se administrează două medicamente denumite combinații de inhibitori de punct de control (de exemplu, ipilimumab și nivolumab), care sunt utilizate pentru tratarea cancerului.

Este posibil ca anumiți copii cu tulburări metabolice congenitale să nu poată beneficia de vaccinul antigripal nazal. În cazul în care copilul dumneavoastră suferă de o tulburare metabolică congenitală, discutați cu medicul pentru a stabili dacă copilului trebuie să i se administreze vaccinul antigripal nazal.

Dacă copilului dumneavoastră nu i se poate administra vaccinul antigripal folosind un spray nazal, medicul dumneavoastră de familie sau farmacistul va discuta cu dumneavoastră despre

administrarea unui alt vaccin antigripal, care se administrează prin injectare.

Este vaccinul antigripal nazal un vaccin viu?

Da, vaccinul antigripal nazal este un vaccin viu. Aceasta înseamnă că vaccinul conține o formă foarte slăbită a virusului gripal, care nu se răspândește și nu provoacă infecție gripală. Administrarea vaccinului antigripal poate preveni îmbolnăvirea copilului dumneavoastră de gripă și îi oferă cea mai bună protecție disponibilă împotriva complicațiilor infecției gripale.

Vaccinul antigripal nazal poate provoca gripă?

Nu. Vaccinul antigripal nazal nu poate provoca gripă în cazul copilului dumneavoastră.

Deoarece vaccinul antigripal nazal este un vaccin viu atenuat, copiii pot elimina o cantitate foarte mică din virusul vaccinal atenuat timp de câteva zile. Acest virus vaccinal este mult mai slab decât virusul gripal obișnuit. Acesta nu va provoca infectarea cu gripă a copilului dumneavoastră. Răspândirea virusului vaccinal atenuat la alte persoane este extrem de rară și nu s-a demonstrat că acesta poate provoca infectarea cu gripă a acestor persoane.

Există efecte secundare ale vaccinului antigripal nazal?

Vaccinul antigripal este un vaccin foarte sigur.

Cele mai frecvente reacții adverse sunt ușoare. Acestea includ congestia nazală sau rinoreea, durerile de cap și durerile musculare. Unii copii fac febră (temperatură) după vaccin, dar, de obicei, aceasta este ușoară și dispare de la sine.

Reacțiile adverse grave, cum ar fi reacțiile alergice severe, sunt foarte rare.

Ce se întâmplă dacă copilul meu nu se simte bine după vaccinare?

Dacă copilul dumneavoastră are febră (temperatură) sau durere de cap, îi puteți administra paracetamol sau ibuprofen. Nu administrați aspirină sau medicamente numite salicilați copiilor, cu excepția cazului în care acestea au fost prescrise de un medic. Acest lucru este important în special în primele 4 săptămâni de la administrarea vaccinului.

Discutați cu medicul dumneavoastră de familie sau cu farmacistul dacă copilul dumneavoastră se simte foarte rău după vaccinare, deoarece ar putea fi din alte motive.

Copilul meu este alergic la ouă. I se poate administra vaccinul antigripal nazal?

Da. Vaccinul antigripal poate fi administrat majorității copiilor alergici la ouă. Discutați cu medicul dumneavoastră de familie, farmacistul sau vaccinatorul.

Copilul meu are astm. I se poate administra vaccinul antigripal nazal?

Da. Vaccinul antigripal se poate administra majorității copiilor cu astm.

Copilului dumneavoastră nu trebuie să i se administreze vaccinul antigripal nazal dacă are astm sever sau dacă a prezentat șuierat astmatic sau dacă a avut nevoie de inhalator mai mult decât de obicei pe parcursul a 3 zile înainte de vaccinare.

În cazul în care copilul dumneavoastră a avut nevoie în mod regulat de steroizi administrați pe cale orală sau dacă a trebuit să se prezinte în secția ATI din cauza astmului, trebuie să discutați despre vaccinul antigripal nazal cu echipa sa de specialiști/medicul pneumolog sau asistentul medical.

Discutați cu medicul dumneavoastră de familie sau cu farmacistul.

Copilul meu are mai puțin de 2 ani. I se poate administra vaccinul antigripal nazal?

Nu. Vaccinul antigripal nazal poate fi administrat doar copiilor cu vârsta de cel puțin doi ani.

Dacă copilul dumneavoastră are o afecțiune cronică, ceea ce înseamnă că prezintă risc în cazul îmbolnăvirii de gripă, acestuia i se poate administra un alt vaccin antigripal care se administrează prin injectare.

Discutați cu medicul dumneavoastră de familie sau cu farmacistul.

Copilul meu are 18 ani sau mai mult. I se poate administra vaccinul antigripal nazal?

Nu. Dacă copilul dumneavoastră are o afecțiune cronică, adică prezintă risc în caz de gripă, acestuia i se poate administra un alt vaccin antigripal, care se administrează prin injectare.

Discutați cu medicul dumneavoastră de familie sau cu farmacistul

Unde i se poate administra copilului meu vaccinul antigripal nazal?

Vaccinul antigripal nazal poate fi administrat de medicul dumneavoastră de familie sau de farmacist.

Este posibil ca anumitor copii să li se administreze vaccinul antigripal nazal în școală, de către echipele HSE, medici de familie sau farmaciști.

Cât costă vaccinul antigripal nazal?

Dacă copilul dumneavoastră are vârsta cuprinsă între 2 și 17 ani, vaccinul și consultația la medicului de familie sau farmacist sunt gratuite.

Pentru mai multe informații, consultați:
www.hse.ie/flu

De asemenea, pe site-ul web **www.hpra.ie** puteți găsi un link de accesare a broșurii de informare a pacientului privind vaccinul. Căutați marca Fluenz, pentru a citi broșura corespunzătoare de informare a pacientului.

Raportarea efectelor secundare

În cazul în care considerați că aveți un efect secundar după administrarea vaccinului, puteți raporta acest lucru către Autoritatea de reglementare a produselor medicale (HPRA), pe www.hpra.ie. De asemenea, medicul dumneavoastră, asistentul medical, farmacistul sau un membru al familiei poate raporta efectul secundar către HPRA.

FLU VACCINE

Protect yourself.
Protect others.

National Immunisation Office
(Oficiul Național de Imunizare)
www.hse.ie/flu

Cod de comandă: HNI01369
Iulie 2026